arXiv:1704.05109v1 [math.AG] 17 Apr 2017

NORMES DE DROITES SUR LES SURFACES CUBIQUES

par

J.-L. Colliot-Thélène

Abstract. — Let k be a field and $X \subset \mathbf{P}^3_k$ a smooth cubic surface. Let $\Delta \subset \mathrm{Pic}(X)$ be the finite index subgroup spanned by norms of lines on X_K for K running through the finite separable extensions of k. The quotient $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ is 3-primary. If X contains a line defined over k, then $\Delta = Pic(X)$.

1. Le théorème

Soient k un corps, $\overline{k}$ une clôture séparable de k, et $X \subset \mathbf{P}^3_k$ une k-surface cubique projective lisse, et $\overline{X} = X \times_k \overline{k}$. Soit $\Delta \subset \mathrm{Pic}(X)$ le sous-groupe d'indice fini engendré par les classes de normes de droites sur X_K pour K/k parcourant les extensions finies séparables de k. Un résultat classique dit que le groupe de Picard $\mathrm{Pic}(\overline{X})$ est engendré par les droites de $\overline{X}$. Un argument de norme montre alors que sur k le quotient $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est de torsion, et donc est un groupe fini. On montre ici :

Théorème 1.1. — *Soient k un corps et X une k-surface cubique lisse. Soit $\Delta \subset \mathrm{Pic}(X)$ le sous-groupe d'indice fini engendré par les classes de normes de droites sur X_K pour K/k parcourant les extensions finies de k.*

(i) Le quotient $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est un groupe de torsion 3-primaire.

(ii) Si X possède une droite définie sur k, alors $\Delta = \mathrm{Pic}(X)$.

Le résultat obtenu est un analogue en dimension 2 d'un résultat de M. Shen [**3**] sur les hypersurfaces cubiques de dimension au moins 3 possédant une droite définie sur k, résultat qui m'a été signalé par O. Wittenberg.

On utilise librement les propriétés des surfaces cubiques lisses et des surfaces de del Pezzo, comme peut les trouver par exemple dans [**1**] et [**2**]. On utilise

en particulier le fait qu'une surface cubique lisse sur un corps $\overline{k}$ séparablement clos est déployée : les 27 droites sont définies sur $\overline{k}$.

2. La démonstration

Proposition 2.1. — *Soit X une k-surface cubique lisse possédant une k-droite L. Soit $f : X \to \mathbf{P}^1_k$ la fibration en coniques définie par la famille des 2-plans contenant la k-droite L.*

(i) Cette fibration possède 5 fibres géométriques réductibles, chacune composée de 2 droites concourantes de $\overline{X}$.

(ii) Le morphisme induit $L \to \mathbf{P}^1_k$ induit par f est de degré 2.

(iii) La fibre générique X_η est une conique lisse sur le corps $k(\mathbf{P}^1)$ qui possède un point de degré 2 défini par la restriction de L.

(iv) Soit $O \in \mathbf{P}^1(k)$ un k-point et X_O la fibre. Soit I l'ensemble des composantes irréductibles des fibres X_P, pour P point fermé de $\mathbf{P}^1_k$ dont la fibre X_P n'est pas géométriquement intègre sur $k(P)$. Notons $C_i, i \in I$, ces diverses composantes. La restriction à la fibre générique donne naissance à une suite exacte

$$\mathbb{Z}X_0 \oplus \oplus_{I \in I}\mathbb{Z}C_i \to \mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_\eta) \to 0.$$

(v) La classe de L et la classe de chacune des courbes C_i appartient au sous-groupe $\Delta \subset \mathrm{Pic}(X)$.

(vi) Le groupe $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est un quotient de $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/5$.

(vii) Si l'ensemble des points fermés $P \in \mathbf{P}^1_k$ de fibre X_P géométriquement réductible n'est pas réduit à un point fermé de degré 5, alors $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est un quotient de $\mathbb{Z}/2$.

(viii) S'il existe une section de la fibration $f : X \to \mathbf{P}^1_k$ définie par une k-droite de X, c'est-à-dire s'il existe une k-droite de X qui ne rencontre pas L, ou si X_η n'a pas de point $k(\mathbf{P}^1)$-rationnel, alors $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est un quotient de $\mathbb{Z}/5$, et est engendré par la classe de X_0.

Démonstration. — Notant $\omega = \omega_{X_\eta/k(\mathbf{P}^1)}$ la classe du faisceau canonique. Le groupe $\mathrm{Pic}(X_\eta)$ est libre de rang 1. On a $\mathrm{Pic}(X_\eta) = \mathbb{Z}\omega$ si et seulement si la conique $X_\eta/k(\mathbf{P}^1)$ n'a pas de point rationnel, c'est-à-dire si et seulement si la fibration f n'admet pas de section. Si f admet une section $\sigma \subset X$, alors le diviseur 2σ se restreint à la classe ω dans $\mathrm{Pic}(X_\eta)$. La structure des mauvaises fibres géométriques de f est bien connue [**1**, Lemme IV.15]. Dans $\mathrm{Pic}(X)$, la classe de $5X_0$ est égale à la somme des fibres dégénérées de f, et chacune de ces fibres appartient à Δ. □

Proposition 2.2. — *Soit X une surface cubique lisse sur le corps k. Le groupe fini $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ n'a pas de ℓ-torsion pour $\ell \neq 2, 3, 5$.*

Démonstration. — Par un argument de norme, on peut supposer que le groupe de Galois absolu de k est un pro-ℓ-groupe. L'action du groupe de Galois sur $\mathrm{Pic}(\overline{X})$ se factorise par $W(E_6)$. Comme l'ordre de ce groupe ne contient pas d'autre facteur premier que 2, 3 et 5, l'action est donc triviale. Toutes les droites de $\overline{X}$ sont alors définies sur k, et elles engendrent $\mathrm{Pic}(X) = \mathrm{Pic}(\overline{X})$. □

Proposition 2.3. — *Soit X une surface cubique lisse sur le corps k. Le groupe fini $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ n'a pas de 5 torsion.*

Démonstration. — Par un argument de norme, on peut supposer que le groupe de Galois absolu de k est un pro-5-groupe.

Comme 27 n'est pas divisible par 5, X contient une k-droite. En utilisant une telle k-droite, on définit une fibration en coniques $f : X \to \mathbf{P}^1_k$ donc la fibre générique X_η a une section sur $k_{alg}(t)$ d'après le théorème de Tsen (ici k_{alg} désigne une clôture algébrique de k) donc qui a aussi une section sur $k(t)$ puisque X_η est une conique et que le prodegré de $k_{alg}(t)/k(t)$ est purement 5-primaire. Ainsi la fibration f admet une section. La surface X est en particulier k-rationnelle.

Comme 27 modulo 5 est 2, il y a au moins 2 k-droites, L et M. Supposons que ces deux k-droites L et M se rencontrent. Alors M est une composante d'une des fibres géométriques dégénérées. Cette fibre est donc définie sur k. Comme il y a 5 fibres géométriques dégénérées, les autre fibres dégénérées sont définies sur k, puis leurs composantes, formées de deux droites sont aussi définies sur k. La fibration définie par L a ainsi toutes ses fibres dégénérées formées de k-droites.

On a donc au moins 11 k-droites. Comme 27-11= 16, il existe encore au moins une k-droite qui n'est pas parmi ces 11. Cette k-droite N ne rencontre pas L, puisque les 10 qui rencontrent L sont déjà là. Mais alors N définit une section de la fibration définie par L, et on conclut que $\mathrm{Pic}(\overline{X})$ est déployé, et donc $\mathrm{Pic}(X)/\Delta = 0$.

On suppose désormais que deux k-droites quelconques de X ne se rencontrent pas. Si on prend la fibration associée à L, on voit qu'elle a 5 fibres géométriques dégénérées, et que toutes leurs composantes sont définies sur la même extension cyclique de degré 5 de k. En outre, il existe une section de cette fibration, définie par la droite M. D'après la Proposition 2.1, $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est égal au $\mathbb{Z}/5$-module engendré par X_0

La droite M rencontre une seule fois chaque fibre géométrique dégénérée. Dans chaque fibre, on peut donc choisir la composante qui ne rencontre pas M. La réunion de ces 5 composantes R_i et de M forme un sextuplet de droites gauches deux à deux, globalement rationnel. On peut contracter ce sextuplet sur un $\mathbf{P}^2_k$. Dans le plan, considérons la conique qui contient les 5 points conjugués images des R_i. Elle est définie sur k. Son image inverse dans X est

une k-droite, dont la classe est $2\lambda_0 - \sum_{i=1}^5 R_i$, où l'on a noté $\lambda_0 \in \mathrm{Pic}(X)$ la classe de l'image réciproque d'une k-droite de $\mathbf{P}^2$. On voit donc que $2\lambda_0$ est dans Δ. Le groupe de Picard de $\overline{X}$ est la somme directe $\mathbb{Z}\lambda_0 \oplus \mathbb{Z}M \oplus \sum_{i=1}^5 \mathbb{Z}R_i$. Le groupe de Picard de X est donc engendré par λ_0, M et la somme $\sum_{i=1}^5 R_i$. On voit donc que $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est annulé par 2.

Ainsi $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est annulé par 2 et 5. Il est donc nul. □

Proposition 2.4. — *Soit X une surface cubique lisse sur le corps k. Le groupe fini* $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ *n'a pas de 2-torsion.*

Démonstration. — On peut supposer que le groupe de Galois absolu de k est un pro-2-groupe. Comme 27 est impair, il y a au moins une k-droite. On utilise une k-droite L-pour fibrer en coniques sur $\mathbf{P}^1_k$. Comme il y a 5 fibres géométriques dégénérées, vu l'hypothèse sur k, il existe au moins un k-point à fibre dégénérée, décomposée sur $\overline{k}$ en une somme $l_1 + m_1$ de deux droites de $\overline{X}$. D'après la proposition 2.1, le groupe $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ est soit nul soit $\mathbb{Z}/2$.

En outre $\mathrm{Pic}(X)/\Delta = 0$ si l'une des deux conditions suivantes est satisfaite :

a) La fibre générique X_η n'a pas de point rationnel sur son corps de base $k(\mathbf{P}^1)$.

b) Il existe une k-droite de X qui est une section de la fibration $X \to \mathbf{P}^1_k$.

Supposons désormais que l'on n'a ni a) ni b). On va montrer que ceci n'est pas possible.

Comme on n'est pas dans le cas a), la fibre générique X_η possède alors un $k(\mathbf{P}^1)$-point. Il existe donc une section σ de la fibration $X \to \mathbf{P}^1_k$. On peut supposer $(\sigma.l_1) = 1$ et $(\sigma.m_1) = 0$. Ainsi l_1 et m_1 sont des k-droites. La section σ rencontre chacune des fibres géométriques en un seul point. Ceci définit un quintuplet globalement rationnel de droites $l_i, i = 1, \ldots, 5$ gauches deux à deux, chacune rencontrant σ. Les autres composantes des 5 fibres géométriques dégénérées forment un autre quintuplet globalement rationnel de droites $m_i, i = 1, \ldots, 5$ gauches deux à deux, avec $(\sigma.m_i) = 0$ pour tout i. Sur le corps k, on peut contracter simultanément les 5 droites m_i. On obtient une surface Y munie d'un k-morphisme $Y \to \mathbf{P}^1_k$ compatible avec $X \to \mathbf{P}^1_k$.

La surface Y est une surface de del Pezzo de degré 8, c'est soit $\mathbf{P}^2_k$ éclaté en un k-point avec la projection évidente $Y \to \mathbf{P}^1_k$ soit $\mathbf{P}^1_k \times_k \mathbf{P}^1_k$ avec disons la projection sur le second facteur (on utilise ici l'existence d'une section de $X \to \mathbf{P}^1_k$).

Dans le premier cas, soit $E \subset Y$ la courbe exceptionnelle. Son transformé propre sur X a une auto-intersection au plus égale à -1, donc en fait égale à -1. Ce transformé propre est donc une k-droite de X qui est une section de $X \to \mathbf{P}^1_k$, et on a exclu la situation b).

Dans le second cas, c'est-à-dire $Y \simeq \mathbf{P}^1_k \times_k \mathbf{P}^1_k$ soit $P \in Y(k)$ le k-point obtenu par contraction de la k-droite m_1. Soit τ la section de la projection

$\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1 \to \mathbf{P}^1$ passant par le k-point P. Sur Y, elle est d'auto-intersection nulle. Son transformé propre sur X est un $\mathbf{P}^1$ d'auto-intersection au plus -1, donc égal à -1, et de nouveau on a exclu la situation b). □

Proposition 2.5. — *Soit X une surface cubique lisse sur le corps k. Si X possède une droite k-rationnelle, alors le groupe fini* $\mathrm{Pic}(X)/\Delta$ *n'a pas de 3-torsion.*

Démonstration. — On peut supposer que le groupe de Galois absolu de k est un pro-3-groupe. Utilisons la k-droite pour faire une fibration en coniques $f : X \to \mathbf{P}^1_k$. On a 5 mauvaises fibres géométriques, ce qui fait soit 5 fibres définies sur k soit un triplet et 2 fibres définies sur k. Dans chaque fibre définie sur k, les deux composantes sont des droites k-rationnelles. On voit donc qu'il existe deux k-droites gauches deux à deux. On utilise alors l'une des deux droites pour faire une nouvelle fibration en coniques. L'autre droite définit une section de cette nouvelle fibration. Cette nouvelle fibration a une k-fibre dégénérée. On conclut avec la proposition 2.1. □

Remarque 2.6. — On ne peut omettre l'hypothèse d'existence d'une droite k-rationnelle dans l'énoncé de la proposition 2.5. Soit K/k une extension cubique cyclique de corps. Prenons dans $\mathbf{P}^2_k$ deux points fermés M_1 et M_2 de degré 3 en position générale, chacun défini sur K. Sur la surface cubique $X \subset \mathbf{P}^3_k$ obtenue par éclatement de M_1 et M_2, dont on sait bien décrire les 27 droites géométriques en termes des 6 points de $\mathbf{P}^2_{\overline{k}}$ définis par $M_1 \cup M_2$, des droites passant par 2 de ces 6 points, et des coniques passant par 5 de ces 6 points, on vérifie que la classe $\lambda_0 \in \mathrm{Pic}(X)$ de l'image réciproque d'une k-droite de $\mathbf{P}^2_k$ n'est pas dans $\Delta \subset \mathrm{Pic}(X)$, et l'on a $3\lambda_0 \in \Delta$.

La combinaison des propositions 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 donne le théorème 1.1. On a le corollaire :

Corollaire 2.7. — *Soit X une k-surface cubique lisse possédant une k-droite. Soit U le complémentaire des droites géométriques. Alors le réseau $\hat{T} := \overline{k}[U]^*/\overline{k}^*$ est un module galoisien coflasque : pour tout sous-groupe fermé H du groupe de Galois absolu, on a $H^1(H, \hat{T}) = 0$. La suite exacte*

$$0 \to \overline{k}[U]^*/\overline{k}^* \to \oplus_{i=1}^{27} \mathbb{Z} l_i \to \mathrm{Pic}(\overline{X}) \to 0,$$

où les l_i sont les 27 droites de $\overline{X}$, est une résolution coflasque du module galoisien $\mathrm{Pic}(\overline{X})$.

Références

[1] A. Beauville, Surfaces algébriques complexes, Astérisque **54**, 3ème éd. (1978).

[2] Yu. I. Manin, Cubic forms, Algebra, Geometry, Arithmetic, North Holland Mathematical Library vol. 4, 2nd edition, North Holland 1986.

[3] M. Shen, Rationality, universal generation and the integral Hodge conjecture, arXiv :1602.07331v2 [math.AG] 12 Dec 2016.

---

17 avril 2017

J.-L. Colliot-Thélène, Université Paris Sud, Mathématiques, Bâtiment 425, 91405 Orsay Cedex, France